Produto: Curativo Hidrocoloide Extrafino M-TEC



Descrição: M-TEC Hidrocoloide Extrafino é um curativo adesivo hidrocoloide, isento de gelatina, composto por uma matriz hidrocoloide laminada a uma película de poliuretano semipermeável, impermeável à água e antibacteriana.

Ao entrar em contato com o exsudato, o curativo forma um gel suave que mantém um ambiente úmido ideal para a cicatrização, favorecendo os processos de granulação e epitelização.

A formação do gel reduz a aderência do curativo ao leito da ferida, permitindo sua remoção de forma atraumática, sem dor e sem comprometer o tecido em regeneração.

Indicação: O M-TEC Hidrocoloide Extrafino é indicado para o tratamento, proteção e manejo de feridas com nível leve a moderado de exsudação, incluindo: Úlceras vasculogênicas, lesão por pressão e úlceras do pé diabético; Queimaduras de primeiro e segundo grau; Zonas dadoras e áreas de enxertos cutâneos; Feridas superficiais e pequenas abrasões; Proteção de pele fragilizada ou de áreas sujeitas à fricção, como cotovelos, calcanhares e região sacral; Área perístoma, para proteção da pele contra efluentes de ostomias; Cobertura pós-operatória para proteção de suturas; Prevenção e manejo de assaduras na região de fralda em bebês.

Registro ANVISA Nº: 80003300052

Composição: Matriz elastomérica, pós gelificantes/absorventes, elastômeros termoplásticos, filme transparente de PU/PE, liner siliconizado e adesivo sensível a pressão. Isento de Látex.

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo e ao abrigo da luz, com temperatura ambiente entre 0 e 40°C.

Precauções: A esterilidade do produto é garantida, exceto se a embalagem estiver danificada. O tratamento de úlceras deve ser realizado dentro de um plano terapêutico supervisionado por um

profissional de saúde. No início do uso, a ferida pode parecer maior devido à remoção de tecido desvitalizado; caso continue aumentando, procure orientação médica.
A ferida deve ser monitorada para sinais de infecção, como dor, vermelhidão, sangramento, edema, odor ou secreção incomum. Em caso de infecção, o uso do curativo deve ser supervisionado por profissionais de saúde.
Raramente podem ocorrer irritação, maceração ou hipergranulação. Se esses efeitos aparecerem, consulte um profissional de saúde. Caso a ferida não evolua adequadamente ou surjam sintomas inesperados, busque avaliação médica. O produto é de uso único, devendo ser descartado após a remoção.

Advertências: Não utilizar em pacientes com sensibilidade conhecida ao produto ou a qualquer um de seus componentes, especialmente aos poliisobutenos e à carboximetilcelulose.

Instruções de Uso:

1. Limpe cuidadosamente a área da ferida com solução apropriada.
2. Avalie o tamanho da ferida e selecione um curativo que permita uma margem de aproximadamente 2,5 cm além do rebordo da ferida.
3. Abra a embalagem estéril e manuseie o curativo utilizando luvas ou pinça estéril.
4. Remova as películas protetoras da face adesiva do curativo.
5. Centralize o curativo sobre a ferida e sobre a pele circundante, pressionando suavemente para garantir boa adesão.
6. Evite esticar o curativo durante a aplicação, pois isso pode causar traumas mecânicos na ferida e na pele ao redor.

Remoção do Curativo

1. Levante cuidadosamente as bordas do curativo enquanto pressiona a pele adjacente.
2. Continue soltando as bordas até que todo o perímetro esteja descolado.
3. Pressione a pele para auxiliar na separação e remova o curativo lentamente.
4. Dobre o curativo sobre si mesmo e puxe suavemente na direção do crescimento dos pelos.
5. Alternativamente, esticar o curativo horizontalmente pode facilitar a remoção em algumas situações.
6. Descarte o curativo usado em recipiente adequado.

Frequência de Troca

1. O curativo pode permanecer aplicado por até 7 dias, desde que esteja íntegro e sem sinais de saturação.
2. Substitua imediatamente caso seja observada fuga de exsudato pelas bordas.
3. Troque o curativo quando atingir sua capacidade máxima de absorção, conforme avaliação clínica.

Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.

Produto Estéril por Irradiação Gama. USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.

Apresentação / Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e embalagens conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO DO ITEM	DIMENSÃO	EMBALAGEM PRIMÁRIA	EMBALAGEM SECUNDÁRIA	EMBALAGEM DE TRANSPORTE
CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRAFINO M-TEC 10CM X 10CM CART. C/ 10UN	10 x 10cm	Envoltório de papel	Cartucho de papel cartão	Caixa de papelão

Apresentação comercial:

Cód. Venda	Descrição do item	Curativos/Cartucho	Cód. Barras EAN 13	Cód. Barras EAN 13
			Envoltório	Cartucho
PA. 1744	Hidrocoloide Extrafino M-TEC 10cm x 10cm – 10 un por Cartucho	10	7896544928541	7896544928534

Elaboração: Data:__/__/__	Aprovação: Data:__/__/__